


INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE „SZCZEPIONKI – PRZYŃĘTY”
PRZEZNACZONE DO PRZEPROWADZENIA
SZCZEPIEŃ LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIZNIE



- Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących, drogą zrzutów z samolotów, zostaną wyłożone przynęty z zatopionym blistrem zawierającym szczepionkę.
- Przynęty w kształcie ściętych stożków, koloru szarego, o wymiarach 3,9 x 3,5 x 1,5 cm zawierają zatopiony, plastikowy pojemnik z płynną szczepionką.
- Prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt.
- Przynęty, które były dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy.
- Dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki na błony śluzowe człowieka względnie na uszkodzony naskórek należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza.
- W przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii.
- Po wyłożeniu przynęt, przez okres 3 tygodni, trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY
ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU
AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
PRZECIWKO WŚCIEKLIZNY

Warmińsko – Mazurski

Wojewódzki Lekarz Weterynarii